

流涙や目の障害

三河乳がんクリニック

緊急時 TEL 0566-91-1037

ティーエスワンを服用することによって、涙が出やすくなる（流涙）という副作用が報告されています。下記の症状が出現した場合は、病院へ報告し、眼科を受診して下さい。



【自覚症状】流涙、目の充血、目が痛い、物が見えにくい、目がかすむ、目が乾く、結膜炎、角膜炎など

【発現時期】投与開始から3か月以内が多く、1カ月以内と早く出現することもあります。

【予防方法】眼内のティーエスワンの成分を洗い流すことが重要です。**防腐剤を含まない人工涙液の点眼**を 1回2-3滴、1日6回以上行ってください。ただし、水道水は使用しないでください。

*点眼（洗浄）回数が多いほど効果的です。


防腐剤を含まない人工涙液の例



医療用医薬品で、防腐剤を含まない点眼はありませんので、薬局やドラッグストアでご購入ください。ご購入時は、薬剤師にご相談ください。



目の症状チェックシート



三河乳がんクリニック

緊急時 TEL 0566-91-1037

- ・ ティーエスワン服用開始日

_____年 _____月 _____日から

*該当する症状がありましたら □に✓（チェック）をつけて 下さい。	症状はいつか らですか？
□涙が多い、またはあふれる	年 月 日 頃から
□目ヤニが多い	年 月 日 頃から
□見えにくい	年 月 日 頃から
□眼がかすむ	年 月 日 頃から
□眼が痛い	年 月 日 頃から
□眼がゴロゴロする	年 月 日 頃から
□眼が赤い（充血）	年 月 日 頃から
□かゆい、よく眼をこする	年 月 日 頃から
□まぶしい	年 月 日 頃から

眼科を受診しましたか？ _____年 _____月 _____日