

ティーエス ワン® 副作用対策

三河乳がんクリニック

薬剤部

2023/5/12更新

ティーエスワン® の副作用対策内服薬

①下痢対策

【下痢止め】

ロペラミド錠1mg 1回1錠



②吐き気止め

ドンペリドン錠10mg

1回1錠

吐き気があるとき



* 流涙

下痢について (ティーエスワン)

三河乳がんクリニック
緊急時 TEL 0566-91-1037

普段より便の回数や下痢を伴うことがあります



⑥泥状便になった時、ロペラミド錠1mgを1錠内服して下さい。30分経過しても下痢が治まらない場合は、さらに1錠追加して内服して下さい。

*以下の症状がある場合はクリニックへお電話下さい。



- 下痢の回数が24時間で8回以上
- 激しい腹痛・めまい・頭痛
- 飲水、飲食ができない

<参考>

ライフスタイルに合わせて下痢止めの薬の使い方・服用タイミングを工夫することも可能です

ケース1

いつも決まった時間帯に
下痢になっているような場合

(例)午前中に下痢が起る場合
▶ 朝食後に下痢止めを服用する



ケース2

自宅にいるときはよいが、外出
するときに心配になるような場合

▶ いつでも服用できるように下痢止めを携帯する
もしくは、
▶ 外出前に下痢止めを服用する



*下痢の時の日常生活の工夫

• 排便後は、ウォシュレットや軟かいトイレトペーパーを使用し肛門周囲を保護しましょう。

• 脱水症状を予防するために、お茶や水、スポーツドリンクなどを補給するようにしましょう。

• 脂っこい食事や、食物繊維が多い食事（ごぼう、レンコンなど）、香辛料の強い食事は避けるようにしましょう。

流涙や目の障害

三河乳がんクリニック

緊急時 TEL 0566-91-1037

ティーエスワンを服用することによって、涙が出やすくなる（流涙）という副作用が報告されています。下記の症状が出現した場合は、病院へ報告し、眼科を受診して下さい。



【自覚症状】流涙、目の充血、目が痛い、物が見えにくい、目がかすむ、目が乾く、結膜炎、角膜炎など

【発現時期】投与開始から3か月以内が多く、1カ月以内と早く出現することもあります。

【予防方法】眼内のティーエスワンの成分を洗い流すことが重要です。**防腐剤を含まない人工涙液の点眼**を 1回2-3滴、1日6回以上行ってください。ただし、水道水は使用しないでください。

*点眼（洗浄）回数が多いほど効果的です。


防腐剤を含まない人工涙液の例



医療用医薬品で、防腐剤を含まない点眼はありませんので、薬局やドラッグストアでご購入ください。ご購入時は、薬剤師にご相談ください。



目の症状チェックシート



三河乳がんクリニック
緊急時 TEL 0566-91-1037

- ・ ティーエスワン服用開始日

_____年 _____月 _____日から

*該当する症状がありましたら ら□に✓（チェック）をつけて 下さい。	症状はいつか らですか？
□涙が多い、またはあふれる	年 月 日 頃から
□目ヤニが多い	年 月 日 頃から
□見えにくい	年 月 日 頃から
□眼がかすむ	年 月 日 頃から
□眼が痛い	年 月 日 頃から
□眼がゴロゴロする	年 月 日 頃から
□眼が赤い（充血）	年 月 日 頃から
□かゆい、よく眼をこする	年 月 日 頃から
□まぶしい	年 月 日 頃から

眼科を受診しましたか？ _____年 _____月 _____日